

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

- Não administrar junto a outros anti-inflamatórios esteroides e não esteroides. Os anti-inflamatórios esteroides podem agravar os efeitos gastrointestinais.
- Não administrar juntamente com antibióticos do grupo dos aminoglicosídeos (Estreptomicina, Gentamicina, Kanamicina e Neomicina).
- Não administrar junto com anticoagulantes como Varfarina e Aspirina.

INFORMAÇÕES PARA USO MÉDICO

O Meloxicam é um anti-inflamatório não esteroide da família dos Oxicans e não possui antídoto específico. No caso de intoxicação e superdosagem sugere-se tratar sintomaticamente e com suporte geral.

Apresentação: Cartucho contendo 1 blister com 10 comprimidos de **Elo-xicam* Comprimidos 0,5 mg**. Conservar à temperatura ambiente (15 °C a 30 °C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Venda sob prescrição do Médico Veterinário. Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 4/2017 em 06/03/17.

Vencimento: 2 (dois) anos após a data da fabricação.



Proprietário: CHEMITEC AGRO-VETERINÁRIA LTDA.
Av. Pres. Wilson, 3458 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 2274-7022
CNPJ (MF): 01.299.649/0001-18 - Ind. Brasileira
*Marca Requerida - www.chemitec.com.br
Resp. Técnica: Adriana Cini - CRMV/SP 8413
Fabricante: Vansil Ind. Com. Repres. Ltda.
R. João Augusto Cirelli, 640 - Descalvado/SP
CNPJ: 50.472.547/0001-68

Elo-xicam*

Comprimidos 0,5mg

Uso Veterinário

Uso Oral

Anti-inflamatório não esteroide para cães e gatos.

Eficácia com ação prolongada,
sem complicações gástricas.

Fórmula:

Cada comprimido de 200 mg contém:
Meloxicam..... 0,5 mg
Excipiente q.s.p. 200 mg

INDICAÇÕES:

Elo-xicam* Comprimidos 0,5 mg é um potente anti-inflamatório não esteroide inibidor de tromboxanos e prostaglandinas, com excelentes propriedades antipirética e analgésica.

Meloxicam é considerado inibidor preferencial da ciclooxigenase - 2 (COX 2) (seletivo), resultando em menores efeitos colaterais e sem complicações gástricas, por um período maior de tratamento.

Elo-xicam* Comprimidos 0,5 mg é indicado em processos inflamatórios dos cães e gatos, nas patologias dolorosas agudas. A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Linha ChemiPet®

Linha ChemiPet®

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Administrar por via oral.

DOSE PARA CÃES: 🐕

Primeiro dia de tratamento:

2 comprimidos de Elo-xicam* Comprimidos 0,5 mg para cada 5 kg de peso corporal (0,2 mg de meloxicam por kg de peso corporal).

Segundo dia de tratamento:

1 comprimido de Elo-xicam* Comprimidos 0,5 mg para cada 5 kg de peso corporal (0,1 mg de meloxicam por kg de peso corporal).

Elo-xicam* Comprimidos 0,5 mg deve ser administrado a cada 24 horas. Recomenda-se um tratamento de 5 a 7 dias consecutivos nos casos de patologias agudas.

A duração do tratamento deverá ser determinada conforme orientação do Médico Veterinário e/ou de acordo com a gravidade da patologia.

DOSE PARA GATOS: 🐈

Dose Única

1 comprimido de Elo-xicam* Comprimidos 0,5 mg para cada 5 kg de peso corporal (0,1 mg de meloxicam por kg de peso corporal).

Elo-xicam* Comprimidos 0,5 mg deve ser administrado a cada 24 horas. Recomenda-se que o tratamento não ultrapasse 4 dias.

CONTRAINDICAÇÕES E RESTRIÇÕES

- Cães e gatos com histórico de distúrbios gastrointestinais ou doenças renais, cardíacas e hepáticas apresentam maior risco de desenvolver efeitos adversos.
- A segurança em fêmeas gestantes não foi estabelecida. **Elo-xicam* Comprimidos 0,5 mg** não deve ser indicado para animais com hipersensibilidade ao ativo Meloxicam.
- Não administrar em animais com possível ulceração gastrointestinal ou que apresentarem evidência de desordem hemorrágica.
- Não utilizar o produto em intoxicações por drogas anticoagulantes (Ex: Cumarina).

PRECAUÇÕES DE USO

- Ter cautela em animais desidratados, hipovolêmicos, ou hipotensos, devido ao risco de desenvolvimento de toxicidade renal.
- Obedecer às dosagens e a via de administração indicada na posologia deste produto.
- Obedecer às contraindicações e limitações de uso do produto.
- Atentar para o prazo de validade do produto após a abertura da embalagem.
- Ler a bula atentamente antes de administrar o produto.
- Interromper o tratamento em caso de vômitos, diarreias ou perda de apetite.

REAÇÕES ADVERSAS E EFEITOS COLATERAIS

- Podem ocorrer reações adversas como perda de apetite, diarreias e vômitos; nestes casos interromper o tratamento.
- Os choques anafiláticos em animais devido ao uso do Meloxicam são raros, no entanto, o Médico Veterinário deve estar atento à possibilidade da ocorrência. Estas reações são geralmente transitórias e tendem a desaparecer no término do tratamento.