

CHEMITEC

Flunixin Injetável

CHEMITEC

Uso Veterinário

Anti-inflamatório, Analgésico, Antitérmico e Antiendotóxico.



FÓRMULA - Cada 100 mL contém:

Flunixinina (meclumina)5,0 g
Veículo q.s.p.100 mL

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS, EQUINOS E SUÍNOS: - ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 04 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM BOVINOS PRODUTORES DE LEITE PARA CONSUMO HUMANO. NÃO UTILIZAR EM BEZERROS A SEREM PROCESSADOS PARA VITELA. A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

INDICAÇÕES:

Flunixin Injetável Chemitec® é um anti-inflamatório não esteroide, não narcótico que apresenta potente ação analgésica, antitérmica e antiendotóxica. É indicado para equinos, bovinos e suínos para o tratamento da dor (inclusive cólica), febre e processos inflamatórios.

Equinos: • nas cólicas: alívio imediato da dor visceral equina evitando autolesões. • nos distúrbios músculo-esqueléticos: alívio da dor e controle da inflamação. • nas afecções do aparelho locomotor (distensões e claudicações). • na dor pós-traumática ou pós-operatória.

Bovinos: • nos distúrbios músculo-esqueléticos do aparelho locomotor. • na dor pós-traumática ou pós-operatória. • na paresia pós-parto (vaca caída, febre vitular) onde apresenta excelente grau de eficácia. • nas mastites ambientais, tóxicas e hiperagudas, como terapia complementar (baixa a febre, a inflamação e alivia a dor). • na diarreia do bezerro recém-nascido. • tratamento auxiliar nos processos infecciosos, principalmente no Complexo Respiratório Bovino, atuando como anti-inflamatório, antitérmico e analgésico (baixa a febre e estimula o bovino a alimentar-se normalmente).

Suínos: • nos distúrbios do aparelho locomotor com presença de inflamação e dor (coxeadura). • na síndrome MMA (mastite-metrite-agalaxia). • na dor pós-traumática ou pós-operatória.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Aplicar por via intramuscular ou endovenosa. A dose recomendada é de 1,1 mg de flunixinina/kg de peso corporal para equinos, 1,1 a 2,2 mg de flunixinina/kg de peso corporal para bovinos e 2,2 mg/kg para suínos.

Equinos: • alívio da dor associada à cólica: 1 mL de **Flunixin Inj. Chemitec**® /45 kg de peso corporal por via endovenosa. Repetir o tratamento se as cólicas reaparecerem. • distúrbios músculo-esqueléticos: 1 mL de **Flunixin Injetável Chemitec**® /45 kg de peso corporal, por dia, durante 5 dias por via intramuscular ou endovenosa.

Bovinos: • na diarreia do recém-nascido: 2 a 3 mL de **Flunixin Injetável Chemitec**® por bezerro, por via intramuscular ou endovenosa. Geralmente uma só aplicação é suficiente. • nas outras afecções: 2 mL de **Flunixin Injetável Chemitec**® /45 kg de peso corporal, por via intramuscular ou endovenosa.

Suínos: • distúrbios do aparelho locomotor: 2 mL de **Flunixin Inj. Chemitec**® /45 kg de peso corporal, por dia, durante 1 a 3 dias. • síndrome MMA: 2 mL de **Flunixin Injetável Chemitec**® /45 kg de peso corporal, via intramuscular profunda ou endovenosa, por dia. Repetir o tratamento após 12 horas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não administrar em conjunto com outras drogas anti-inflamatórias não esteroides. Não deve ser administrado em conjunto com anestésicos à base de metoxiflurano e drogas nefrotóxicas.

CONTRAINDICAÇÕES: • Respeitar as indicações de dose e duração do tratamento. • Não aplicar por via intra-arterial. • Aplicar com precaução em animais com ulceração gastrintestinal ou com desordens renal, hepática ou hematológica preexistentes. • Não usar em touros utilizados na reprodução. • Recomenda-se evitar o uso da droga em fêmeas prenhes ou empregar com máxima precaução e supervisão do Médico Veterinário.

EFEITOS COLATERAIS: Vômito, diarreia e gastrite podem ocorrer após tratamento. Se estes persistirem, a medicação deve ser suspensa.

APRESENTAÇÃO: Frascos-ampola com 10, 50 e 100 mL.

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no M. A. sob o nº 7.204 em 27/01/2000.

VENCIMENTO: 2 (dois) anos após a data da fabricação.



Proprietário: **CHEMITEC AGRO-VETERINÁRIA LTDA.**
Av. Pres. Wilson, 3458 - São Paulo/SP - Tel.: (11) 2274-7022
CNPJ (MF) 01.299.649/0001-18 - Indústria Brasileira
@Marca Registrada - www.chemitec.com.br
Resp. Técnico: Adriana Cini - CRMV/SP 8413
Fabricante: Vetecia Lab. de Produtos Veterinários Ltda.
Rua Dr. Alfredo Ramos, nº 236 - Jacareí/SP
CNPJ (MF) nº 07.685.131/0001-07

0028-02
30A
85x130
V/2018