

"VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO".
A aplicação deverá ser feita sob orientação do Médico Veterinário.
Licenciado no M. A. sob nº 9.800/2014 em 05/05/14.

VENCIMENTO: 02 (dois) anos após a data da fabricação.

CHEMITEC

Chemiflor[®]

Solução Injetável

Uso Veterinário

Antibiótico injetável para bovinos à base de Florfenicol



FÓRMULA - Cada 100 mL contém:

Florfenicol	30 g
Veículo q.s.p.	100 mL

CHEMITEC
Agro-Veterinária

Proprietário: **CHEMITEC AGRO-VETERINÁRIA LTDA.**
Av. Pres. Wilson, 3458 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 2274-7022
CNPJ (MF) 01.299.649/0001-18 - Ind. Brasileira
©Marca Registrada - www.chemitec.com.br
Resp. Técnico: Adriana Cini - CRMV/SP 8413
Fabricante: Vetecia Lab. De Produtos Veterinários Ltda.
R. Dr. Alfredo Ramos, nº 236 - Jacareí/SP
CNPJ (MF) nº 07.685.131/0001-07

0016-01
45A
170x130
IV/2017

ATENÇÃO:

OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 11 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE - ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

PROPRIEDADES:

O Florfenicol é um antimicrobiano derivado do Tianfenicol, que apresenta o mesmo mecanismo de ação do Cloranfenicol, ou seja a inibição proteica.

Possui um amplo espectro de ação antibacteriana que inclui todos os micro-organismos sensíveis ao Cloranfenicol.

O Florfenicol é diferenciado pela substituição do grupo hidroxilo em C-3 por um átomo de flúor evitando a acetilação pela CAT e por essa razão confere ao antibiótico atividade bacteriana contra micro-organismos resistentes ao Cloranfenicol. Devido a essa substituição, o espectro antibacteriano do Florfenicol é superior ao do Tianfenicol e Cloranfenicol.

CHEMIFLOR atua com níveis séricos inibitórios em dose única ou por um período de 48 horas sendo altamente eficaz no tratamento de doenças respiratórias bovina causadas por: *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Klebsiella pneumoniae* e *Corynebacterium pyogenes*.

INDICAÇÕES:

CHEMIFLOR é indicado para o tratamento de:

- Doenças respiratórias bovina causada por *Pasteurella multocida*, *Corynebacterium pyogenes*, *Haemophilus somnus*, *Klebsiella pneumoniae* e *Streptococcus pyogenes*;
- Diarreias decorrentes de enterites infecciosas causadas por *Escherichia coli* e *Salmonella typhimurium*;
- Infecções uterinas causadas por *Haemophilus somnus*, *Corynebacterium pyogenes*, *Pasteurella multocida* e *Escherichia coli*;
- Pododermatites causadas por *Fusobacterium necrophorum* e *Dichelobacter nodosus*;
- Ceratoconjuntivite infecciosa bovina causada por *Moraxella bovis*.

DOSAGEM E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

1. Para doenças causadas por: *Escherichia coli*, *Pasteurella multocida*, *Corynebacterium pyogenes*, *Haemophilus somnus*, *Fusobacterium necrophorum*, *Klebsiella pneumoniae*, *Moraxella bovis*, *Salmonella typhimurium*, *Dichelobacter nodosus* e *Streptococcus pyogenes*:

Administrar por via subcutânea a dose de 40 mg por kg de peso

vivo, equivalente a 2 mL para cada 15 kg.

Dose única.

2. Para doenças causadas por: *Escherichia coli*, *Corynebacterium pyogenes*, *Dichelobacter nodosus* e *Streptococcus pyogenes*:

Administrar por via intramuscular preferencialmente na tábua do pescoço a dose de 20 mg por kg de peso vivo, equivalente a 1 mL para cada 15 kg.

Em duas aplicações com intervalo de 48 horas.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:

- Não administrar em vacas leiteiras com mais de 20 meses de idade, uma vez que podem apresentar resíduo da droga no leite.
- Não administrar o produto em gado produtores de leite, durante a fase de lactação, quando o mesmo for destinado ao consumo humano.
- **CHEMIFLOR** na dose indicada pode provocar reações de hipersensibilidade local que desaparece sem necessidade de tratamento.
- Não administrar o produto em fêmeas que amamentam bezerros destinados a vitelos.
- Quando o volume a ser aplicado ultrapassar 10 mL, dividi-lo em dois ou mais pontos de aplicação.

PRECAUÇÕES GERAIS:

- O produto não apresenta risco para o meio ambiente e as embalagens podem ser descartadas com os mesmos cuidados dispensados a qualquer outra embalagem de medicamento.
- Obedecer as dosagens e recomendações para o uso do produto.
- Não comer, beber ou fumar durante seu manuseio. Lavar bem as mãos após a manipulação do produto.
- Não reutilizar as embalagens vazias.

APRESENTAÇÃO:

Frascos de vidro transparente contendo 30 e 100 mL.

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.