

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

“VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.”
A aplicação deverá ser feita sob orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no M. A. sob o nº 7.667 em 09/03/01.

VENCIMENTO: 2 (dois) anos após a data da fabricação.



Proprietário: **CHEMITEC AGRO-VETERINÁRIA LTDA.**
Av. Pres. Wilson, 3458 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 2274-7022
CNPJ (MF) 01.299.649/0001-18 - Ind. Brasileira
®Marca Registrada - www.chemitec.com.br
Resp. Técnico: Adriana Cini - CRMV/SP 8413
Fabricante: Biofarm Química e Farmacêutica Ltda.
Av. João Batista Ferraz Sampaio, nº 710
Jaboticabal/SP - CNPJ (MF): 00.256.591/0001-62

0022-01
55A
170x130
VI/2017

CHEMITEC®

Chemitril® Injetável 10%

Uso Veterinário

**Antibiótico de amplo espectro
Injetável**



FÓRMULA - Cada 100 mL contém:
Enrofloxacino (Ácido 1-ciclopropil-7-[4-etil-1-piperazinil]-6-fluoro-1,4-diidro-4-oxo-3-quinoleína-carboxílico)10,0 g
Veículo q.s.p.100,0 mL

ATENÇÃO:
OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS E CAPRINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE - ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.
SUÍNOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 05 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

INDICAÇÃO DE USO

Chemitril® Injetável 10% é indicado para bovinos, suínos e caprinos no tratamento de infecções causadas por bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, Espiroquetas e Micoplasmas sensíveis ao Enrofloxacino.

É especialmente indicado nas enterites bacterianas, diarreias (primárias ou secundárias) e demais infecções digestivas causadas por *Escherichia coli*, *Salmonella spp*, *Treponema hyodysenteriae* e outros germes.

Nas pneumonias e infecções respiratórias causadas por *Staphylococcus spp*, *Mycoplasma spp*, *Pasteurella spp*, *Bordetella bronchiseptica* e *Haemophilus spp*.

Nas infecções após o parto, infecções das vias genito-urinárias, do umbigo e casco causadas por *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Escherichia coli* e *Corynebacterium spp*.

Nas metrites, mastites e agalaxias (Complexo MMA) causadas por *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Escherichia coli*, *Klebsiella spp* e *Mycoplasma spp*.

Nas infecções por *Anaplasma spp* (Anaplasmoze).

Nas infecções do ouvido (otite) causadas por *Pseudomonas spp*, *Proteus spp*, *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*.

Nas infecções dérmicas (piodermites) causadas por *Pseudomonas spp*, *Proteus mirabilis*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus intermedius*.

Chemitril® Injetável 10% é recomendado como preventivo de infecções pós-operatórias como: castrações, descornas, laparotomias e lesões acidentais.

Chemitril® Injetável 10% é indicado para todas as infecções causadas por micro-organismos sensíveis ao Enrofloxacino. O uso profilático deste medicamento fica a critério do Médico Veterinário.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Administrar por via **intramuscular, subcutânea ou endovenosa**.
Dosagem terapêutica: 2,5 mg do ingrediente ativo por kg de peso vivo. Uma vez ao dia.

Bovinos, suínos e caprinos:

Aplicar 1,0 mL de **Chemitril® Injetável 10%** para cada 40 kg de peso vivo, diariamente, durante 3 a 5 dias. Nas infecções respiratórias complicadas e anaplasmoze aplicar 1,0 mL de **Chemitril® Injetável 10%** para cada 20 kg de peso vivo, durante 5 dias (5,0 mg/kg de peso vivo).

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não administrar o produto em conjunto com complexos vitamínicos ou soluções contendo ferro, zinco, manganês e cálcio, pois reduzem a absorção do Enrofloxacino.

RECOMENDAÇÕES

- Recomenda-se a continuidade do tratamento por um período de 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.
- Recomenda-se que previamente à aplicação de qualquer produto injetável, seja feita uma vacinação contra bactérias do gênero *Clostridium* nas regiões onde há histórico desse tipo de infecção. Produtos injetáveis podem provocar aparecimento de clostridioses.

PRECAUÇÕES

- Quando o volume a ser aplicado for superior a 10 mL, aconselha-se dividir este volume em dois ou mais pontos de aplicação.
- Observar os cuidados normais de assepsia para injeções nos animais.

EFEITOS COLATERAIS

Chemitril® Injetável 10% não é tóxico. É muito bem tolerado nas doses e formas de aplicação indicadas.

APRESENTAÇÃO:

Chemitril® Injetável 10% é apresentado sob a forma de solução injetável, acondicionado em frascos-ampola de 10, 50 e 500 mL.