

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Após aberto utilizar o produto no prazo máximo de 30 dias.

"VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO".
A aplicação deverá ser feita sob orientação do Médico Veterinário. Lic. no M. A. sob o nº 7.759 em 10/05/01.

VENCIMENTO: 2 (dois) anos após a data da fabricação.



Proprietário: CHEMITEC AGRO-VETERINÁRIA LTDA.
Av. Pres. Wilson, 3458 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 2274-7022
CNPJ (MF): 01.299.649/0001-18 - Ind. Brasileira
@Marca Registrada - www.chemitec.com.br
Resp. Técnico: Adriana Cini - CRMV/SP 8413
Fabricantes: Biofarm Química e Farmacêutica Ltda.
Av. João Batista Ferraz Sampaio, nº 710 Jaboticabal/SP
CNPJ: 00.256.591/0001-62
Rhoifarma Ind. Farmacêutica Ltda.
Rua Calêndulas, 250 - Hortolândia/SP
CNPJ: 04.913.008/0001-08

0021-02
50A
170x130
XI/2018

CHEMITEC

Chemitritil® Injetável 2,5%

Uso Veterinário

**Antibiótico de amplo espectro
Injetável**

FÓRMULA - Cada 100 mL contém:

Enrofloxacinó 2,5 g
Veículo q.s.p. 100,0 mL

ATENÇÃO:
OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:
SUÍNOS:

ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 10 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

INDICAÇÃO DE USO

Chemitritil® Injetável 2,5% é indicado para suínos, no tratamento de infecções causadas por bactérias Gram-negativas e Gram-positivas sensíveis ao enrofloxacinó. É especialmente indicado:

- Nas enterites bacterianas, diarreias (primárias ou secundárias) e demais infecções digestivas causadas por *Escherichia coli*, *Salmonella typhimurium*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Campylobacter jejuni* e *Salmonella choleraesuis*;
- Nas pneumonias e infecções respiratórias causadas por *Staphylococcus aureus*, *Pasteurella multocida*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Bordetella Bronchiseptica*;
- Nas infecções após o parto, infecções das vias genito-urinárias, do umbigo e casco causadas por *Staphylococcus aureus* e *Escherichia coli*;
- Nas metrites, mastites e agalaxias (Complexo MMA) causadas por *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*;
- Nas infecções dérmicas (piodermites) causadas por *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus mirabilis*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*.

Chemitritil® Injetável 2,5% é recomendado como preventivo de infecções pós-operatórias como: castrações, laparotomias e lesões acidentais.

Chemitritil® Injetável 2,5% é indicado para todas as infecções causadas por micro-organismos sensíveis ao enrofloxacinó.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

• Suínos:

Aplicar 1,0 mL de **Chemitritil® Injetável 2,5%** para cada 10 kg de peso vivo, (2,5 mg/kg de peso vivo), diariamente, por via intramuscular, durante 3 a 5 dias.

• Nas infecções respiratórias complicadas:

Aplicar 1,0 mL de **Chemitritil® Injetável 2,5%** para cada 5 kg de peso vivo, (5,0 mg/kg de peso vivo), por via intramuscular (suínos) ou subcutânea (cães e gatos) durante 5 dias.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

- Não administrar o produto em conjunto com complexos vitamínicos ou soluções contendo ferro, zinco, manganês e cálcio, pois reduzem a absorção do enrofloxacinó.

RECOMENDAÇÕES

- Recomenda-se a continuidade do tratamento por um período de 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

PRECAUÇÕES

- Quando o volume a ser aplicado for superior a 10 mL, aconselha-se dividir este volume em dois ou mais pontos de aplicação.
- Observar os cuidados normais de assepsia para injeções nos animais.

EFEITOS COLATERAIS

Chemitritil® Injetável 2,5% não é tóxico. É muito bem tolerado nas doses e formas de aplicação indicadas.

APRESENTAÇÃO:

Chemitritil® Injetável 2,5% é apresentado sob a forma de solução injetável, acondicionado em frascos de 20 mL.