

CHEMITEC

Gentatec® Mastite 250mg

Uso Veterinário

Antimicrobiano para Aplicação Intramamária nas Mastites Agudas e Crônicas



FÓRMULA - Cada seringa de 10 mL contém:

Gentamicina (sulfato micronizado)250 mg
Veículo q.s.p.10 mL

ATENÇÃO:

OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS:

ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 30 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE - O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 07 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA O CONSUMO.

PROPRIEDADES:

Gentatec® Mastite 250 mg é uma suspensão oleosa à base de gentamicina, especialmente formulada para aplicação intramamária, no combate à mastite bovina. **Gentatec® Mastite 250 mg** não é irritante para o tecido glandular.

INDICAÇÕES:

Gentatec® Mastite 250 mg é indicado no tratamento das mastites agudas e crônicas das vacas em lactação, causadas por *Staphylococcus aureus* (produtores ou não de coagulase), *Streptococcus agalactiae*, *S. dysgalactiae* e *S. uberis*, *Escherichia coli*, *Enterococcus* sp e *Pseudomonas* sp, sensíveis à gentamicina.

POSOLOGIA:

Aplicar o conteúdo de uma seringa (10 mL) de **Gentatec® Mastite 250 mg** em cada quarto afetado a cada 24 horas, durante 3 dias consecutivos. A posologia pode ser modificada pelo Médico Veterinário, conforme seu critério frente à severidade da infecção. Recomenda-se, entretanto, tratar os animais após o desaparecimento dos sintomas, durante um período não inferior a 48 horas.

MODO DE USAR:

Aplicar **Gentatec® Mastite 250 mg** por via intramamária, tomando o cuidado de:

- Ordenhar completamente os quartos afetados, procurando eliminar ao máximo o leite residual, pús e possível matéria em decomposição.
- Proceder à higiene cuidadosa de todo o úbere, desinfetando bem os tetos. Injetar todo o conteúdo de uma seringa em cada teto afetado.
- Após injetado, massagear o úbere suavemente, de baixo para cima, para facilitar a penetração da suspensão nos quartos.

IMPORTANTE:

Realizar exame bacteriológico 3 semanas após o último tratamento para confirmação da cura da mastite. O exame bacteriológico do leite é o melhor método para evidenciar se a mastite foi realmente curada.

APRESENTAÇÃO: Cartucho contendo 30 seringas de **Gentatec® Mastite 250 mg** de 10 mL cada.

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos. "VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO"

A aplicação deverá ser feita sob orientação do Médico Veterinário. Licenciado no M. A. sob o nº 7.371 em 04/07/2000.

VENCIMENTO: 2 (dois) anos após a data da fabricação.



Proprietário: **CHEMITEC AGRO-VETERINÁRIA LTDA.**
Av. Pres. Wilson, 3458 - São Paulo/SP - Tel.: (11) 2274-7022
CNPJ (MF) 01.299.649/0001-18 - www.chemitec.com.br
Indústria Brasileira - @Marca Registrada
Resp. Técnico: Adriana Cini - CRMV/SP 8413
Fabricante: Vetecia Lab. de Produtos Veterinários Ltda.
Rua Dr. Alfredo Ramos, 236 - Jacareí/SP
CNPJ (MF): 07.685.131/0001-07

0033-01
20A
85x130
11/2018