

PRECAUÇÕES:

- Aplicar somente por via subcutânea, não deve ser usado por via intramuscular ou endovenosa.
- Evitar fumar ou alimentar-se durante o manuseio.
- Lavar as mãos após o manuseio.
- Manter fora do alcance de crianças.
- Guardar as embalagens fechadas, em local seco e ao abrigo da luz solar.
- Não contaminar cursos d'água.
- Descartar corretamente as embalagens vazias para não comprometer o meio ambiente.
- Recomenda-se que previamente à aplicação de qualquer produto injetável, sej a feita uma vacinação contra bactérias do gênero *Clostridium* nas regiões onde há histórico desse tipo de infecção.
- Produtos injetáveis podem provocar aparecimento de clostridioses.
- Como qualquer anti-helmíntico, recomenda-se não submeter os animais a esforços prolongados ou movimentação exagerada antes e após o tratamento.

APRESENTAÇÃO: Frascos plásticos de 50 mL, 500 mL e 1 litro. Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no M. A. sob o nº 7.320 em 15/05/2000.

DATA DO VENCIMENTO: 3 (três) anos após a data da fabricação.



Proprietário: **CHEMITEC AGRO-VETERINÁRIA LTDA.**
Av. Pres. Wilson, 3458 - Ipiranga - São Paulo/SP - Tel.: (11) 2274-7022
CNPJ (MF) 01.299.649/0001-18 - Indústria Brasileira
® Marca Registrada - www.chemitec.com.br
Resp. Técnico: Adriana Cini - CRMV/SP 8413
Fabricante: Biofarm Química e Farmacêutica Ltda.
Av. João Batista Ferraz Sampaio, nº 710
Jaboticabal/SP - CNPJ (MF): 00.256.591/0001-62

0035-01
5A
170x130
V/2017

CHEMITEC®

Ivermectina 1%

CHEMITEC®

Uso Veterinário - Uso Injetável

Endectocida Injetável para bovinos, ovinos, caprinos e suínos.



FÓRMULA - Cada 100 mL contém:

Ivermectina 1 g
Veículo q.s.p. 100 mL

ATENÇÃO

OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 35 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE - ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.
CAPRINOS E OVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE - ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.
SUÍNOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 18 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

INDICAÇÃO E MODO DE USAR:

Endectocida: previne e controla infestações por ectoparasitas e endoparasitas. Indicado no tratamento e controle de vermes redondos pulmonares e gastrintestinais, carrapatos, piolhos, bernes e sarnas de bovinos, ovinos, caprinos e suínos. Auxilia no controle da mosca-do-chifre e previne miases (bicheiras) no umbigo de bezerros recém-nascidos e nas feridas de castração. Aplicar somente por via subcutânea.

Parasitas combatidos pela Ivermectina 1% Chemitec:

Vermes redondos gastrintestinais:

Ostertagia sp
(inclusive formas L4 ou hipobióticas)

Haemonchus sp
Trichostrongylus sp
Cooperia sp
Chabertia sp
Bunostomum sp
Oesophagostomum sp
Nematodirus sp
Strongyloides sp
Trichuris sp
Ascaris sp
Hyostrongylus sp
Stephanurus sp

Vermes Pulmonares

Dictyocaulus sp
Carrapatos*
Boophilus microplus

Miases (bicheiras)**

(preventivo)
Cochliomyia hominivorax
Hipoderma bovis
Oestrus ovis

Bernes

Dermatobia hominis

Piolhos sugadores***

Linognathus sp
Haematopinus sp
Solenoptes sp

Piolhos mastigadores***

Damalinea sp

Ácaros da sarna***

Psoroptes sp
Sarcoptes sp*
Chorioptes sp

Mosca do chifre

Haematobia irritans

Ivermectina Injetável 1% Chemitec atinge eficácia máxima contra carrapatos a partir de 4 a 5 dias após o tratamento.

**** Ivermectina Injetável 1% Chemitec** previne o desenvolvimento de bicheiras do umbigo de bezerros recém-nascidos, quando tratados na primeira oportunidade após o nascimento, preferivelmente dentro de 24 horas; e de feridas da castração de bezerros, quando tratados imediatamente após a cirurgia. Todos os animais tratados com **Ivermectina Injetável 1% Chemitec** após o nascimento ou castração devem ser observados diariamente até a cicatrização. Sempre que houver necessidade de tratamento curativo usar matabicheiras tópico específico.
***** Ivermectina Injetável 1% Chemitec** auxilia no controle destes parasitas quando empregada como parte de programa contínuo de tratamento.

DOSAGENS:

Bovinos: Administrar 1,0 mL para cada 50 kg de peso corpóreo. Recomenda-se aplicar na pele solta na frente ou atrás da escápula.

TABELA DE DOSIFICAÇÃO PARA BOVINOS

PESO (kg)	DOSE (mL)	PESO (kg)	DOSE (mL)
até 50	1,0	de 301 a 350	7,0
de 51 a 100	2,0	de 351 a 400	8,0
de 101 a 150	3,0	de 401 a 450	9,0
de 151 a 200	4,0	de 451 a 500	10,0
de 201 a 250	5,0	de 501 a 550	11,0
de 251 a 300	6,0	de 551 a 600	12,0

Nos bezerros recém-nascidos administrar 1 mL por animal (via subcutânea) para prevenção da onfaloflebite (inflamação do umbigo).

Caprinos e Ovinos: Administrar 0,5 mL para cada 25 kg de peso corpóreo. Recomenda-se aplicar na pele solta desprovida de lã da região axilar.

TABELA DE DOSIFICAÇÃO PARA OVINOS E CAPRINOS

PESO (kg)	DOSE (mL)	PESO (kg)	DOSE (mL)
25	0,5	75	1,5
50	1,0	100	2,0

Suínos: Administrar 1 mL para cada 33 kg de peso corpóreo. Recomenda-se aplicar somente por via subcutânea no pescoço.

TABELA DE DOSIFICAÇÃO PARA SUÍNOS

CATEGORIA DO ANIMAL	PESO (kg)	DOSE (mL)
Leitões e porcos em crescimento	10	0,3
	16	0,5
	33	1,0
	50	1,5
	66	2,0
	83	2,5
Reprodutores	100	3,0
	133	4,0
Porcas e Cachaços	166	5,0
	200	6,0

Para leitões com peso abaixo de 10 kg é importante aplicar a dose com máxima precisão, SOMENTE POR VIA SUBCUTÂNEA. Caso seja necessário, utilizar seringas descartáveis calibradas para injetar até 0,1 mL.