


**EDITORIAL**

TÉCNICO

Adriana Cini
Médica Veterinária - CRMV/SP 8413
Responsável Técnica da Chemitec



Flunixin Injetável Chemitec
Flunixin Meglumina 5 g / 100 mL



Flunixin Comprimidos 5 mg
Flunixin base 5 mg / comprimido



Flunixin Comprimidos 20 mg
Flunixin base 20 mg / comprimido

FLUNIXINA MEGGLUMINA

A Flunixin Meglumina (FM) é um anti-inflamatório não esteroide (AINE) usado somente em Medicina Veterinária. Sua indicação primária consiste no tratamento de enfermidades músculo-esqueléticas e cólicas, em função de seu efeito anti-inflamatório, propiciado pela inibição da enzima ciclooxigenase (COX) e consequente inibição da formação de mediadores químicos, como as prostaglandinas e os tromboxanos. Pode também ser indicado nos casos de endotoxemia, processo inflamatório, dor visceral e febre.

Flunixin Comprimidos e Injetável é indicado para cães nas seguintes afecções:

- **Reumatologia:** nas afecções agudas e crônicas do aparelho locomotor;
- **Oftalmologia:** nas conjuntivites alérgicas ou traumáticas, queratite, neovascularização da córnea, uveíte, coriorretinite e panoftalmia;
- **Choque endotóxico e septicemias;**
- **Pneumologia:** no combate à inflamação;
- **Pós-operatório:** não atrasa a cicatrização e seu efeito analgésico é benéfico para combater as dores pós-cirúrgicas e a inflamação.

MODO DE USAR:

Flunixin Comprimidos 5 mg: Usar por via oral. A dose recomendada é de 1 comprimido para cada 5 kg de peso corpóreo, durante 5 dias consecutivos.

Flunixin Comprimidos 20 mg: Usar por via oral. A dose recomendada é de 1 comprimido para cada 20 kg de peso corpóreo, durante 5 dias consecutivos.

Flunixin Injetável Chemitec: 0,2 mL / 10 kg por dia durante 3 dias por via endovenosa ou intramuscular.

UVEÍTE

A Uveíte é caracterizada pela inflamação da úvea, a túnica média do olho, que compreende a íris, o corpo ciliar e a coroide. Ela pode ser classificada como posterior ou anterior, dependendo da posição que ocorre. Quando não tratada, pode progredir rapidamente para um glaucoma e até mesmo cegueira.

Traumas na região são condições comuns para esse tipo de ocorrência; além disso, infecções bacterianas, virais e até mesmo por fungos podem contribuir para a infecção da região.

Os sintomas mais comuns são dores oculares, notadas pelo comportamento. Encontramos também vermelhidão, nebulosidade nos olhos, lacrimejamento e em alguns casos até mesmo a formação de pus.



Olho de um cão saudável.



Olho de um cão com uveíte.

DEXAMETASONA

Déxium* Comprimidos possui na sua formulação 0,50 mg de acetato de dexametasona, equivalente a 0,454 mg de dexametasona base, que é um análogo sintético à prednisolona, porém com atividade anti-inflamatória mais potente e efeitos metabólicos e hormonais melhorados.

INDICAÇÃO:

Déxium Comprimidos é indicado para cães e gatos devido a sua atividade anti-inflamatória, antirreumática e antialérgica. Suas principais indicações em terapia de suporte são:

- Dermatoses não específicas como eczemas de verão, de origem sistêmica e atópicas;
- Nas condições inflamatórias de vários tipos como nas artrites agudas;
- No tratamento das gonites.

MODO DE USAR:

Déxium Comprimidos:

Cães: De meio a 3 comprimidos por dia, numa só dose ou em 2 vezes.

Gatos: De meio a um comprimido por dia, numa só dose ou em 2 vezes.

Déxium Solução Injetável:

Cães: Terapêutica de urgência: aplicar de 0,25 a 1,0 mg de Dexametasona (0,13 a 0,50 mL de Déxium Solução Injetável) por via endovenosa.

A dose pode ser repetida caso necessário.

Terapêutica de manutenção: aplicar 0,25 a 0,5 mg de Dexametasona (0,13 a 0,25 mL) por via intramuscular ou subcutânea, uma vez ao dia.

Gatos: Terapêutica de urgência: aplicar 0,125 a 0,5 mg de Dexametasona (0,06 a 0,25 mL de Déxium Solução Injetável) por via endovenosa.

A dose pode ser repetida caso necessário.

Terapêutica de manutenção: aplicar 0,125 a 0,5 mg de Dexametasona (0,06 a 0,25 mL de Déxium Solução Injetável) por via intramuscular ou subcutânea, uma vez ao dia.

Referências Bibliográficas:

ANDRADE, A. L. et al. **Uso da flunixin meglumina tópica no tratamento de uveítes em cães.** Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. [online]. 2003, vol. 55, n.2, pp. 160-166 ISSN 0102-0935



Déxium Solução Injetável
Dexametasona 20 mg / 10 mL



Déxium Comprimidos
Dexametasona 5 mg / comprimido

TRATAMENTO DA UVEÍTE

O tratamento das uveítes, independentemente da causa, inclui a utilização de drogas imunossupressoras, sendo os corticosteroides tópicos e/ou sistêmicos os mais empregados (**Déxium Comprimidos**: De meio a 3 comprimidos por dia, em dose única ou em 2 vezes, ou **Déxium Solução Injetável**: De 0,13 mL a 0,50 mL via intramuscular ou subcutânea). Estes são frequentemente utilizados na oftalmologia, principalmente nas doenças de caráter inflamatório e nas doenças imunológicas. A opção pela via de administração vai depender do tipo de doença e da intensidade da inflamação.

São também utilizados outros anti-inflamatórios não esteroides, como a FM (**Flunixin Comprimidos 5 mg**: 1 comprimido a cada 24 horas para 5 kg de peso corpóreo durante 5 dias consecutivos; **Flunixin Comprimidos 20 mg**: 1 comprimido a cada 24 horas para 20 kg de peso corpóreo durante 5 dias consecutivos ou **Flunixin Injetável Chemitec**: 0,2 mL para cada 10 kg de peso corpóreo durante 3 dias por via endovenosa ou intramuscular).

A FM é um composto que possui também atividades analgésica, endotóxica e antipirética. Seu mecanismo de ação consiste na prevenção da síntese de mediadores químicos durante o período em que ocorre a lesão celular, inibindo a dor e a inflamação, no tratamento da uveíte.

Consulte sempre o Médico Veterinário.